



AGRIBIO BORAG migliora la fertilità del fiore aumentando la vitalità del polline. Questo si traduce in una maggiore fecondazione che dà luogo ad una **produzione di frutti superiore**.

In particolare è coinvolto in particolari attività enzimatiche quali la sintesi di proteine e lipidi, la divisione cellulare e la translocazione degli zuccheri. Questo efficientamento non è limitato al solo punto di vista biologico ma si estende anche al punto di vista strutturale: il boro determina una maggiore lignificazione dei tessuti che determina un irrobustimento del fusto tale da **rendere la pianta più resistente agli stress** meccanici ed ambientali (forte vento, gelate, stagione secca etc..) **Per garantire raccolti abbondanti è necessario un apporto di boro** attraverso la concimazione fogliare.

Composizione

Boro Totale: 12%

B₂O₃: 405g/l

Dosi e modalità d'impiego

1 l/ha fioritura, metà fioritura, caduta caliptre



NEI VITIGNI RISOLVE IL **FENOMENO DELL'ACINELLATURA** PER CUI ALCUNI ACINI NON RAGGIUNGONO IL PIENO SVILUPPO ACCRESCENDOSI COME GLI ALTRI DELLO STESSO GRAPPOLO

IL BORO CONTENUTO NEI PRODOTTI DELLA LINEA **AGRIBIO BORAG** È RESO DISPONIBILE ALLE PIANTE CON UNA STRUTTURA CHIMICA SPECIFICAMENTE **STUDIATA PER GARANTIRE UN PERFETTO ASSORBIMENTO**

